



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správa
pro Zlínský kraj**

Lazy V. 654, 760 01 Zlín
T: +420 577 009 641

Doručovací adresa:
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
El. adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



Č. j.: SVS/2026/036948
Vyřizuje: MVDr. Milan Krpec

Chovatelé drůbeže ve
Zlínském kraji
v okruhu 10 km od Vsetína

Ve Zlíně dne 27.02.2026

Informace pro obce a chovatele - pseudomor drůbeže v malochovu drůbeže

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na Vás v souvislosti s potvrzením nebezpečné nákazy – newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) **na území města Vsetína** (k. ú. Vsetín) v nekomerčním zájmovém chovu drůbeže, v němž během 2 dnů uhynulo 6 ks kurů domácích. Chovatel neuvádí maso ani vejce na trh. Všechny zbývající živé kusy drůbeže v ohnisku nákazy byly utraceny.

Informujeme Vás, že v souvislosti s uvedeným ohniskem newcastleské choroby v chovu ptáků chovaných v zajetí a v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. g) *nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nálezů uvedených na seznamu, v platném znění*, **Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Zlínský kraj** kolem tohoto ohniska **nezřizuje** tzv. uzavřené pásmo (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km).

Dovolujeme si Vás požádat o **předání informace obyvatelům Vaší obce o tomto ohnisku newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) a o doporučeních Státní veterinární správy**. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné volní plochy, na kterých by se mohly vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

Vakcinace je povinná v reprodukčních chovech kura domácího a v chovech nosnic s produkcí konzumních vajec s více než 500 kusy nosnic na hospodářství, avšak

doporučujeme všem chovatelům ptáků zvážit vakcinaci svých zvířat nebo nakupovat drůbež již vakcinovanou od prověřených dodavatelů. **Vakcinace je účinným nástrojem prevence, který pomáhá chránit zdraví ptáků a zároveň snižuje riziko šíření nákazy.**

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na naši **krizovou linku 720 995 201**.

Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezů zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž nás neprodleně informovali na naši krizovou linku 720 995 201 a jednali pouze podle našeho pokynu.

Pro úplnost uvádíme, že newcastleská choroba drůbeže je virové onemocnění zařazené do skupiny nebezpečných nákaz. Při onemocnění dochází ke značným ztrátám a u mladé drůbeže může dosáhnout až 100 %. Nemoc se přenáší mezi drůbeží kontaktem, ale i volně žijícím ptactvem, pracovními pomůckami. **Na člověka tato nemoc přenosná není**, ale člověk může být rovněž pasivním přenašečem viru. Virus je nejčastěji vylučován trusem a hlenem z tělních dutin, krví a vnitřnostmi usmrcené nebo uhynulé drůbeže. K onemocnění nejčastěji dochází za 3 - 6 dní po infekci. Nemoc se projevuje u kuřat dýchacími potížemi, někdy i nervovými poruchami. Dospělá drůbež má vysokou horečku, nepřijímá krmivo, je netečná. Nemoc je doprovázena průjmem, nervovými poruchami, zmodráním hřebínku a lalůčků, sípavým dechem a prudkým poklesem snášky. Sípavý dech je způsoben tvorbou našedlého nebo narůžovělého hlenu, který se hromadí v hrtanu a může vytékat z nosních otvorů. Léčba se neprovádí a nemocné kusy se utrácí. Kromě preventivního očkování lze chovy chránit důsledným dodržováním zásad ochrany chovů před zavlečením nákaz.

V příloze zasíláme informační leták k ptačí chřipce, kde jsou uvedena základní preventivní opatření platná i pro pseudomor drůbeže - newcastleskou chorobu.

S pozdravem

MVDr. Michal Kamarád
ředitel Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj
podepsáno elektronicky

Příloha:

Informační leták k ptačí chřipce pro drobnochovatele – stejné pokyny jako pro pseudomor drůbeže

Obdrží:

Dotčené městské a obecní úřady

Na vědomí:

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje